

LVA DE LA VICTIME TRAUMATISEE ET NON TRAUMATISEE



Indications

La LVA doit être réalisée chez toute victime qui est inconsciente se trouvant à plat dos, sur le sol, notamment après un retournement.

La LVA du traumatisé doit être réalisée chez toute victime suspecte ou ayant subi un traumatisme du rachis.



Justifications

La LVA est un geste indispensable pour permettre le libre passage de l'air et pour apprécier la ventilation de la victime. La bascule de la tête en arrière et l'élévation du menton entraînent un décollement de la langue du fond de la gorge et permettent le passage de l'air.



Nombre de SP : 1 à 2



Matériels

- Aucun



Mise en œuvre

A

BASCULE PRUDENTE DE LA TÊTE EN ARRIÈRE: LVA DE LA VICTIME NON TRAUMATISÉ

Desserrer ou dégrafer tout ce qui peut gêner la respiration (col, cravate, ceinture).



SP n°1 :

- Desserrer ou dégrafer tout ce qui peut gêner la respiration (col, cravate, ceinture).
- Si la tête n'est pas dans l'axe la ramener doucement dans l'axe du corps.
- Placer la paume de la main sur le front.
- Placer deux ou trois doigts de l'autre main sur la partie dure sous la pointe du menton, le secouriste peut s'aider du pouce pour saisir le menton.



SP n°1 :

- Basculer doucement la tête en arrière en appuyant sur le front et en élevant simultanément le menton.



SP n°1 :

- Ouvrir la bouche de la victime avec la main qui tient le menton.
- Regarder à l'intérieur de la bouche et enlever les corps étrangers si présence, y compris les prothèses dentaires même celles qui sont restées en place, avec la main qui était sur le front.

SP n° 1 ou 2 :

- Apprécier la présence de la respiration sur 10 secondes.

B

ELEVATION DU MENTON : LVA DE LA VICTIME TRAUMATISEE

Desserrer ou dégrafer tout ce qui peut gêner la respiration (col, cravate, ceinture) ;



SP n° 1 :

- Assurer un maintien tête latéro-latéral.

SP n° 2 :

- Constater l'inconscience de la victime.
- Dégrafer ou desserrer tout ce qui peut gêner la ventilation.



SP n° 1 :

- Placer les index et/ou les majeurs sous l'angle de la mâchoire et au-dessous des oreilles tout en continuant le maintien tête.
- Ouvrir la bouche avec les pouces placés sur le menton et en poussant la mandibule vers l'avant.

Cette position doit être maintenue pour le libre passage de l'air.



SP n° 2 :

- Regarder dans la bouche et enlever le(s) corps étranger(s) si présence.
- Apprécier la ventilation pendant au moins 10 secondes.





C

LVA SUR VICTIME ASSISE

Desserrer ou dégrafer tout ce qui peut gêner la respiration (col, cravate, ceinture) ;

**SP n°1 :**

- Soutenir la tête en position neutre en plaçant ses mains sous le menton et sous l'occiput.
- Ouvrir la bouche si possible

**Risques et contraintes**

La libération des voies aériennes par bascule prudente de la tête en arrière, ou par élévation du menton doivent être effectuée de façon prudente pour éviter un éventuel traumatisme du rachis cervical.

**Critères d'efficacité**

- Après avoir assuré la libération des voies aériennes :
- Si la victime respire la respiration doit s'effectuer normalement ;
- Si la victime est en arrêt ventilatoire, la ventilation artificielle doit permettre un soulèvement de la cage thoracique.

**Points clés**

- La tête doit être basculée prudemment en arrière et maintenue dans cette position.
- L'élévation du menton chez une victime traumatisée doit être maintenue jusqu'à la pose d'un collier cervical ou à la réalisation de gestes d'urgence comme la PLS.
- La bouche doit être ouverte.
- Tout corps étranger visible doit être retiré.

