

PRISE EN CHARGE D'UNE PLAIE GRAVE DE L'ABDOMEN AVEC EVISCERATION

Indications

Face à une plaie de l'abdomen avec éviscération.



Justifications

Face à toute éviscération, modérée ou importante, le secouriste devra mettre en œuvre les techniques de nettoyage (détersion), de désinfection (antisepsie) et d'emballage afin de réduire le risque infectieux et assurer la survie de l'organe.

Nombre de SP : 1 à 2

Matériels

- Gants à usage unique ;
- Flacons de sérum physiologique ;
- Compresses stériles ou pansement américain ;
- Bétadine® ;
- Champ stérile ;
- Bande type Velpeau.

Mise en œuvre



- Se laver les mains (savon ou solution hydroalcoolique).
- Mettre une paire de gants à usage unique.



A

ETAPE 1 : PREPARATION




- Découper ou ôter les vêtements pour mettre en évidence la plaie.



- Prévoir un sac ou des absorbants sous la victime pour conserver un sol propre.
- Rincer la plaie au sérum physiologique pour ôter les souillures.

B

ETAPE 2 : DESINFECTION




- Procéder à la désinfection des bords de la plaie à l'aide d'une ou plusieurs compresses imbibées de Bétadine®. Pour cela :
- Ouvrir le paquet de compresses en le pelant ;
- Placer le côté transparent étanche vers le bas ;
- Arroser les compresses d'un jet de Bétadine®.



- Prendre une compresse, la plier en deux par les coins.





- Effectuer un passage au plus proche de la plaie, avec un côté **UNIQUEMENT SUR LES BORDS DE LA PLAIE.**



- Jeter la compresse dans un sac jaune DASRI.

C

ETAPE 3 : EMBALLAGE



- Couvrir les intestins avec des compresses stériles (ou un pansement américain) imbibés de sérum physiologique.



- Recouvrir par un champ stérile face rugueuse contre la victime.



- Maintenir le champ stérile par une bande crêpe peu serrée ;

Attention ! **NE PAS COMPRIMER LES INTESTINS.**



Risques et contraintes

- Contre-indications : allergie à la Bétadine (povidone iodée).
- Ne pas retirer d'objets étrangers présents au niveau de la plaie : risque d'hémorragie.
- Ne pas mettre de Bétadine sur les intestins.



Critères d'efficacité

- La plaie est propre et débarrassée de toutes souillures retirables.
- Le geste n'est pas douloureux.
- Les viscères sont protégés et humidifiés.



Points clés

- Il est important d'effectuer un nettoyage méthodique de la plaie afin de retirer le maximum de souillures sans contaminer l'intérieur de la plaie.
- La gestuelle doit être délicate afin de ne pas être douloureuse pour la victime.
- Les viscères ne doivent ni être comprimés, ni être laissés à l'air libre, il y a un risque de nécrose dans le cas contraire.



Entretien - Maintenance

- Le matériel doit être vérifié périodiquement (intégrité de l'emballage et péremption) et juste avant son emploi.
- Tout matériel périmé ou tout produit stérile dont l'emballage est dégradé ne doit pas être utilisé mais retourné à la PUI.

